

ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΤΙΝΑ
ΠΕΡΙ
ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΝΤΑ

ΥΠΟ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ,

ΕΦΟΡΟΥ ΤΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΦΕΣΙΟΡΟΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ.



Εν Κερκύρα

1826 Ιουνίου 9 Ε. Ν.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΤΑΤΕ ΑΝΕΡ!

Η φήμη υιοῦ μετὰ τὰ Συγγράμματά Σου μ' ἐκα-
με νὰ γνωρίσω τὸ σεβαστὸν ὄνομά Σου. Εἰς τὴν Ἰτα-
λίαν διατρίβων, ὅταν εἶδε τὸ φῶς τὸ περὶ Φυσιολογίας
Βιβλίον Σου, ἐσάβην μάρτυς τῆς θαυμαστῆς ὑποδοχῆς
καὶ εὐφημισμοῦ του ὑπὸ τῶν πολυμαθεστέρων προφισσό-
ρων τῆς Ἰατρικῆς Ἐπιστήμης. μετ' ὀλίγον ἐσάβην εὐτυ-
χεύων νὰ Σε γνωρίσω καὶ προσωπικῶς. Καὶ εἴαν
διὰ φήμης καὶ συγγραμμάτων ἕκαστος δύναται νὰ
λάβῃ σέβας πρὸς τὸν εὐφημιζόμενον, εἰς ποῖον μέ-
γιστον βαθμὸν θελ' ὑψωθῆν ἀράγε τὸ σεβασ τούτο,
ὅταν καὶ προσωπικῶς τὸν γνωρίσῃ, καὶ ἐκτὸς τῆς
πολυμαθείας του ἔσρη προσέτι εἰς αὐτὸν καὶ τὸ σύμ-
βολον τῆς Ἠθικῆς; Τοιοῦτον εἶναι καὶ τὸ ὅποιον ἐ-
γὼ ἠσθάνθην σέβας πρὸς Σε, Ἀνδρῶν ἄριστε! τοι-
οῦτον δὲ καὶ σ' ἐγνώρισα, πολυμαθὴ λέγω, γενναίας
ψυχῆς, πλήρη λαμπρῶν αἰσθημάτων, καὶ ἐκγονον
ἄξιον τῆς σοφίας τῶν παλαιῶν ἐκείνων προπατόρων
μας. Διὰ ταῦτα τολμῶ νὰ Σε παρακαλέσω νὰ δε-
χθῆς τὴν πρὸς Σε ἀφιέρωσιν τούτου τοῦ μικροῦ μα-
θήματος τῆς πολυγωνομετρίας, τὸ ὅποιον ἐπάνω εἰς ἐν
τμήμα αὐτῆς ἔγραψα.

Εἴαν τὸ μάθημα τούτο δὲν ἤθελε παρακινήσειν
τοὺς ὀρεγομένους τῆς Μαθηματικῆς νὰ ῥίψωσιν ἐν

βλέμμα εις αὐτό, ὡς πόνημα ὄν, ἀνθρώπου ἀγνώστου
εἰς τὸν λαμπρὸν Οὐρανόν, ὅπου ἀγωνίζονται τόσα
πολυμαθέστατα ὑποκείμενα, εἶμαι ὁμως βέβαιος, ὅτι
ἐλπύοντες εἰς αὐτὸ τὸ ὄνομά Σου, θέλουν παρα-
κινήθην νὰ τ' ἀναγνώσῃ καὶ εὐμενῶς νὰ τὸ ὑποδε-
χθῶσι. καὶ ἤθελα νομισθῆν εὐτυχῆς, εἰάν τὸ μικρὸν
μου τοῦτο πόνημα ἀρχίσῃ ἀπὸ Σοῦ νὰ λάβῃ ἄριστον
ὑποδοχὴν Εἰμι δὲ ,

Κερκύρα τῆ Δ.τῆ Ἀπριλίου 1826. Ε. Ν.

Πρὸς Τὸν Ἐπισημονικώτατον Δόκτορα

Κύριον Γ. ΘΕΡΙΑΝΟΝ

Προφύσσαρα τῆς Ἰατρικῆς καὶ
τῆς Μαθηματικῆς Φυσικῆς

Τῆς Σοφολογιότητός τῆς
Ταπεινὸς Δούλος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΝΔΗΝΟΣ.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΝ .

Τὸ αἶτιον, τὸ ὁποῖον μὲ παρεκίνησε νὰ γράψω τὸ ἀκόλουθον μάθημα εἶναι, ἐπειδὴ ἕως τοῦ νῦν δὲν εὔρηκα εἰς κανένα τῶν Συγγραφέων ἕσους ἀνέγνωσα, μίαν λύσιν, συναγομένην ἀπὸ γενικὸν τύπον. Ὁ Κύριος (Puissant) ὁμιλεῖ μὲν περὶ τούτου, ἀλλ' εἰς μερικὰς περιπτώσεις, καὶ ἔχει εἰς ἰδιαίτερον κλάδον καὶ γενικὸν Θεώρημα. διὰ τοῦτο ἐγὼ θέλων νὰ ὠφελήσω τὸ κατὰ δύναμιν τοὺς μαθητάς μου, ἀπεφάσισα νὰ θέσω ὑπὸ γενικὸν τύπον τὴν καταμέτρησιν τοῦ ἑμβαδοῦ τῶν εὐθυγράμμων σχημάτων, καὶ ν' ἀποδείξω, ὅτι ὁ αὐτὸς Νόμος ἀκολουθεῖ, ὅποιοςδήποτε καὶ ᾖ ἢναι ὁ ἀριθμὸς τῶν πλευρῶν ἐνὸς πολυγώνου.

Ε β β ω σ ο .

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 1.η.

ΘΕΩΡΗΜΑ Α.η

σχ. 1 Εάν ἐκβληθῶσι δύο μὴ παράλληλοι πλευραὶ ἐνὸς πολυγώνου, ἢ σχηματιζομένη ἐξ αὐτῶν γωνία εἶναι ἴση μὲν τῷ ἀθροισμα τῶν γωνιῶν τοῦ δοθέντος Πολυγώνου, ἐκείνων, αἵτινες σχηματίζονται ἐκ τῶν πλευρῶν τοῦ Πολυγώνου τῶν μεταξὺ τῶν δύο ἐκβεβλημένων, μετὸν α ἐρθῶν τοσάκις ὅσαι εἶναι αἱ πλευραὶ τοῦ πολυγώνου μεταξὺ τῶν δύο ἐκβεβλημένων πλευρῶν. ὡς καλοῦντες T τὴν σχηματιζομένην γωνίαν ἐκ τῶν δύο ἐκβεβλημένων, καὶ K τὸ ἀθροισμα τῶν σχηματιζομένων γωνιῶν ἐκ τῶν πλευρῶν τοῦ πολυγώνου τῶν μεταξὺ τῶν δύο ἐκβεβλημένων, μὴ παραιτούντες εἰς τὴν ἀριθμῶσιν καὶ τὰς δύο ἐκβεβλημένας, καὶ v τὸν ἀριθμὸν τῶν πλευρῶν τοῦ πολυγώνου τῶν μεταξὺ τῶν δύο ἐκβεβλημένων, θέλομεν ἔχειν

$$T = K = 2v.$$

Τὸ σχηματιζόμενον πολύγωνον ἐκ τῶν δύο ἐκβεβλημένων πλευρῶν, καὶ ἐκ τῶν εἰς αὐτὰς περιλεισμένων εἶναι $v - 2$ πλευρῶν, καὶ διὰ τοῦτο, τὸ ἀθροισμα τῶν ἐντὸς γωνιῶν του εἶναι ἴσον μὲν $(v - 2 - 2) \cdot 2$ ὅρ. καὶ καλοῦντες ταύτην τὴν ποσότητα (ἀφ' οὗ ὅμως ἀφαιρέσωμεν τὴν γωνίαν T) K' , ἔχομεν

$$K' = v \cdot 2 \text{ ὅρ.} - T \text{ καὶ } T = v \cdot 2 \text{ ὅρ.} - K'.$$

Πρέπει τώρα νὰ παρατηρήσωμεν, ὅτι ἀφοῦ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὸ ἀθροισμα ὅλων τῶν γωνιῶν τοῦ σχηματιζομένου πολυγώνου τὴν γωνίαν T , τὴν ὑποίαν σχηματίζουν αἱ δύο ἐκβεβλημένοι, τὸ ὑπόλοιπον K' ἄλλο δὲν εἶναι εἰμὴ αἱ εἰσερχόμεναι (*rientranti*) ἢ αἱ ἐξερχόμεναι (*passanti*) γωνίαι του, καὶ ἐπειδὴ αἱ v πλευραὶ τοῦ δοθέντος πολυγώνου ἀιμεταξὺ τῶν δύο ἐκβεβλημένων, ἰνωμέ.αι ἀπὸ δύο σχηματίζουν ἀπὸ τὸ ἐν μέρος τὰς γωνίας τοῦ σχηματιζομένου πολυγώνου, καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο σχηματίζουν τὰς γωνίας τοῦ δοθέντος

πολυγώνου, και επειδή το άθροισμα δύο γωνιών αίτινες σχημα-
 τίζονται ελόγουρα μιās σιγμαής με τās αύτās δύο πλευράς, είναι
 ίσον με τέσσαρας όρθās, λοιπόν εκάστη τών γωνιών τούτων είναι
 ίση με τέσσαρας όρθās μείον τής απέναντι κατά κορυφήν τάυ-
 της. και διά τούτο μία τών γωνιών τούτων του σχηματιζομένου
 πολυγώνου είναι ίση με τέσσαρας όρθās μείον τής ανάλογου ταύ-
 της του δοθέντος πολυγώνου, και επειδή μεταξύ τών δυο εκβε-
 βλημένων πλευρών εύρίσκονται ν πλευραι, τών όποιών τά άκρα
 άνοούνται διαδοχικώς τουτέστιν ή πρώτη με την δευτέρα, και ή δευ-
 τέρα με την τρίτη, και ούτως έφεξής, διά τούτο σχηματίζουν
 ν - 1 από το έν μέρος γωνίας του δοθέντος πολυγώνου, και πα-
 ρομοίως ν - 1 από το άλλο μέρος του σχηματιζομένου εκ τών δύο
 εκβεβλημένων πλευρών πολυγώνου, διά τούτο όλαι αι τοιαύται
 ν - 1 γωνίαι του σχηματιζομένου πολυγώνου, είναι ίσαι με ν - 1
 φορές τέσσαρας όρθās μείον τών ν - 1 ανάλογων γωνιών του δο-
 θέντος πολυγώνου, και καλοϋντες το άθροισμα τούτων τών γωνιών
 του σχηματιζομένου πολυγώνου K'', και τās ανάλογους τούτων K''',
 έχομεν

$$K'' = (ν - 1) \cdot 4 \sigma^{\circ} - K'''$$

Μένει νά θεωρήσωμεν την σχηματιζομένην γωνίαν του σχηματι-
 ζομένου πολυγώνου εκ τής μιās τών δυο εκβεβλημένων και τής μι-
 ας πλευράς τών περικλεισμένων μεταξύ τών δυο εκβεβλημένων, έ-
 κείνης, ήτις ένοείται εις έν σημείον με την εκβεβλημένην, αυτη
 ή γωνία είναι ίση με δύο όρθās μείον τής προσκειμένης εις αυτην, ήτις
 είναι και γωνία του δοθέντος πολυγώνου. λοιπόν καλοϋντες ταύ-
 την την γωνίαν του σχηματιζομένου κ, και την ανάλογον ταύτης
 του δοθέντος πολυγώνου κ', έχομεν κ = 2 σ^ο - κ', και λέγοντες
 τά αυτά και διά την άλλην γωνίαν, την όποιαν σχηματίζει ή άλλη
 εκβεβλημένη, θέλομεν εχειν κ'' = 2 σ^ο - κ''. λοιπόν το άθροι-
 σμα όλων τών γωνιών του σχηματιζομένου πολυγώνου εκτός τής
 γωνίας Γ, είναι ίση με K'' + κ + κ'', τουτέστιν ίσον με
 (ν - 1) 4 σ^ο + 2 σ^ο - κ' + 2 σ^ο - κ'' - K'' = ν · 4 σ^ο - (κ + κ'') - K'''.
 ή ίσον με

$$4\sigma^{\circ} \cdot ν - (K'' + κ + κ''')$$

Τουτέστι τὸ ἄθροισμα ὄλων τῶν γωνιῶν ἐκτὸς τῆς γωνίας T τοῦ σχηματιζομένου πολυγώνου ἐκ τῶν δύο ἐκβεβλημένων πλευρῶν, τοῦ τέστι τὸ K' εἶναι ἴσον μὲ

$$v \cdot 400^\circ - (K'' + x' + x'')$$

Καὶ ἐπειδὴ ἀνωτέρω εἰδείξαμεν

$$K' = v \cdot 200^\circ - T.$$

Διὰ τοῦτο

$$200^\circ - v - T = 400^\circ \cdot v - (K'' + x' + x'')$$

Τουτέστι

$$T = 200^\circ \cdot v - 400^\circ \cdot v + (K'' + x' + x'')$$

$$\text{ἢ} \quad T = -200^\circ \cdot v + (K'' + x' + x'')$$

Τὸ δὲ $K'' + x' + x''$ παριστάνει ὡς ἀνωτέρω ἴδομεν τὸ ἄθροισμα τῶν γωνιῶν τοῦ δοθέντος πολυγώνου ἐκείνων αἰτίας σχηματίζονται μὲ τὴν κατ' ἐξακολουθήσειν ἰσῶσιν τῶν ἐκβεβλημένων καὶ τῶν εἰς αὐτάς περιελισσμένων πλευρῶν τοῦ πολυγώνου, τὸ ὅποιον ἄθροισμα καλῶ K . λοιπὸν ἔχομεν

$$T = -200^\circ \cdot v + K = -(200^\circ v - K)$$

$$n'' T = K - 200^\circ \cdot v \quad \text{καὶ} \quad \eta \mu T = \pm \eta \mu K.$$

Λαμβάνομεν τὸ $+$, ὅταν v ᾖναι 0, 2, 4, 6 . . . τουτέστιν ἄρτιος ἀριθμὸς καὶ τὸ $-$ ὅταν τὸ v ᾖναι περιττός, διὰ τοῦτο, εἴαν τὸ K ᾖναι ἴσον μὲ $B + \Gamma + \Delta + E + Z + \kappa\tau.$ ἔχομεν

$$\eta \mu T = \pm \eta \mu (B + \Gamma + \Delta + E + Z + \kappa\tau.)$$

Παραδ : γ: εἴαν ἐκβεβληθῶσιν αἱ πλευραὶ $H Z$, καὶ $A B$, ἕως νὰ συναντηθῶσιν εἰς τὸ Γ , ἐπειδὴ τὸ σχηματιζόμενον πολυγώνον $B' \Gamma' \Delta' E' Z' T$ ἔχει γωνίας, διὰ τοῦτο τὸ ἄθροισμα

$$B' + \Gamma' + \Delta' + E' + Z' + T = (6 - 2) \cdot 200^\circ \quad \text{καὶ}$$

$$T = (6 - 2) 200^\circ - \Gamma' - \Delta' + E' - Z' \cdot B'$$

καὶ ἐπειδὴ

$$B' = 200^\circ - B, \quad \text{καὶ} \quad \Gamma' = 400^\circ - \Gamma, \quad \Delta' = 400^\circ - \Delta, \quad E = 400^\circ - E.$$

8

$$\text{και } Z' = 200^\circ - Z,$$

εχομεν

$$B' + \Gamma' + \Delta' + E' + Z' = 16^\circ -$$

$$(B + \Gamma + \Delta + E + Z) \text{ και}$$

$$T = (6 - 2) 2^\circ = 16^\circ + (B + \Gamma + \Delta + E + Z)$$

α"

$$T = - 4 \cdot 2^\circ + (B + \Gamma + \Delta + E + Z)$$

β"

$$T = (B + \Gamma + \Delta + E + Z) \cdot 4 \cdot 2^\circ \text{ και}$$

$$\eta\mu T = \eta\mu (B + \Gamma + \Delta + E + Z)$$

ΘΕΩΡΗΜΑ Β.ο'

Τὸ ἔμβαδὸν ἑνὸς τριγώνου εἶναι ἴσον μὲ τὸ ἡμίθροισμα τῶν γινομένων τῶν πλευρῶν τοῦ ἐκτὸς μιᾶς, ἑκάστου τῶν τοιούτων γινομένων, πολλαπλασιαζομένου διὰ τοῦ ἡμιτόνου τῆς ἐκ τῶν ἰδίων δύο πλευρῶν σχηματιζομένης γωνίας.

σχ. 2 Ἐστω τὸ $\Delta A T B$ τρίγωνον. λήγω δτι τὸ ἔμβαδὸν τοῦ, τὸ ὁποῖον καλῶ Σ θέλω εἶσθαι ἴσον μὲ τὸ ἡμισυ τοῦ γινομένου $A T$ διὰ ΓB καὶ ἡμ $\Delta T B$ τῆς περιχομένης γωνίας ἐκ τῶν δύο πλευρῶν $A T$ καὶ $T B$, καλοῦντες τὴν πλευρὰν $A T = b$ καὶ τὴν $B T = a'$, τὴν δὲ γωνίαν $\Delta T B = (\alpha', b)$ ἔχομεν

$$\Sigma = \frac{1}{2} a' b \eta\mu (\alpha', b)$$

ἐκ τῆς κορυφῆς B ἀχθῆτω ἡκάθετος $B \Delta$, ὅθεν ἔχομεν

$$\frac{B \Delta \times A T}{2} = \Sigma$$

2

καὶ ἐπειδὴ $1 : \eta\mu T : \alpha' : B \Delta$, συνάγομεν $B \Delta = \alpha' \eta\mu T$

$$\text{καὶ } \Sigma = \frac{1}{2} a' b \eta\mu T = \frac{1}{2} a' b \eta\mu (\alpha', b).$$

Θ Ε Ω Ρ Η Μ Α Γ °

Τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς τετραπλεύρου εἶναι ἴσον μὲ τὸ ἡμιᾶθροισμα τῶν γινομένων τῶν πλευρῶν τοῦ ἀνὰ δύο ἐκτὸς μίᾳς ἑκάστου τούτων τῶν γινομένων πολλαπλασιαζομένου διὰ τοῦ ἡμιτόνου τῆς γωνίας τὴν ὁποίαν σχηματίζουν αἱ δύο πλευραὶ, αἵτινες εὐρίσκονται εἰς τὰ μέρη τὰ γινόμενα

σγ. 3 Ἐστω τὸ τετράπλευρον Α Β Γ Δ, λέγω, ὅτι ἔχομεν

$$\Sigma = \frac{1}{2} (a b \eta\mu (\alpha, b) + a c \eta\mu (\alpha, c) + b c \eta\mu (b, c))$$

Ἐπειδὴ ἐκβαλλομένων τῶν δύο πλευρῶν a , καὶ c , ἔχομεν τὸ τρίγωνον Α Τ Δ σύνθετον ἐκ τοῦ δοθέντος τετραπλεύρου, καὶ ἐκ τοῦ τριγώνου Β Τ Γ, λοιπὸν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ δοθέντος τετραπλεύρου, τὸ ὁποῖον καλῶς Σ , εἶναι ἴσον μὲ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου Α Τ Δ μείον τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ τριγώνου Β Τ Γ, τούτεστι

$$\Sigma = \text{Α Τ Δ} \cdot \text{Β Τ Γ. ἀλλὰ Α Τ Δ} = \frac{(a + \alpha)(c + \beta)}{2} \eta\mu T,$$

$$\text{καὶ Β Τ Γ} = \frac{\alpha \beta}{2} \eta\mu T,$$

$$\Sigma = \frac{(a c + c \alpha + \beta a + \beta \alpha)}{2} \eta\mu T - \frac{\alpha \beta}{2} \eta\mu T =$$

$$\frac{(a c + c \alpha + \beta a)}{2} \eta\mu T.$$

Καὶ ἐπειδὴ εἰς τὸ τρίγωνον Β Τ Γ ἔχομεν $a : b :: \eta\mu Β Γ Τ : \eta\mu T$,

ἢ $a : b :: \eta\mu (200^\circ - \Delta Γ Β) : \eta\mu T$, ἢ $a : b :: \eta\mu Γ : \eta\mu T$,

Παρομοίως $\beta : b :: \eta\mu Β : \eta\mu T$ καὶ $\alpha = \frac{b \eta\mu Γ}{\eta\mu T}$.

$$\beta = \frac{b \eta\mu Β}{\eta\mu T}$$

Τούτεστι τὰ μέρη τῶν δύο ἐκβελημένων πλευρῶν a καὶ c προσδιορίζονται διὰ μίσου τῆς περιχλεισμένης πλευρᾶς b καὶ τοῦ ἡμιτόνου

τῆς σχηματιζομένης γωνίας Γ ἐκ τῶν δύο ἐκβεβλημένων πλευρῶν a καὶ c καὶ ἐκ τῶν γωνιῶν B καὶ Γ τῶν προσκειμένων τῶν ἐκβεβλημένων πλευρῶν, καὶ ἀντιστάγοντες ἀντὶ τῆς Γ γωνίας (b, c) καὶ ἀντὶ τῆς B τὴν (a, b) , ἔχομεν

$$a = \frac{b \eta\mu (b, c)}{\eta\mu (a, c)} \quad \text{καὶ} \quad \beta = \frac{b \eta\mu (a, b)}{\eta\mu (a, c)}$$

Καὶ ἀντιστάγοντες εἰς τὴν ἔκφρασιν τοῦ Σ ταύτας τὰς Τιμὰς, ἔχομεν

$$\Sigma = \frac{1}{2} \left(ac + \frac{ab \eta\mu (a, b)}{\eta\mu (a, c)} + \frac{cb \eta\mu (b, c)}{\eta\mu (a, c)} \right) \times$$

$$\eta\mu (a, c) = \frac{1}{2} (ac \eta\mu (a, c) + ab \eta\mu (a, b) + cb \eta\mu (b, c)) =$$

$$\frac{1}{2} (ab \eta\mu (a, b) + ac \eta\mu (a, c) + bc \eta\mu (b, c))$$

Θ Ε Ω Ρ Η Μ Α Δ ' .

σχ. 4 'Τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς πενταγώνου εἶναι ἴσον μὲ τὸ ἡμιάθροισμα τοῦ γινομένου τῶν πλευρῶν τοῦ ἀνὰ δύο μείον μιᾶς, ἑκάστου τῶν μερικῶν γινομένων πολλαπλασιαζόμενου διὰ τοῦ ἡμιτόνου τῆς γωνίας τὴν ὁποίαν σχηματίζουν αἱ δύο πλευραὶ ἑκάστου γινομένου.

Ἐξω τὸ $A B \Gamma \Delta E$ πεντάγωνον, καὶ ἄς ἐκ βληθῶσιν αἱ δύο αὐτοῦ πλευραὶ $\Delta \Gamma, A B$, αἵτινες ἐνόουν τὰ δύο ἄκρα μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς πλευρᾶς τοῦ πενταγώνου ὡς τῆς $B \Gamma$, ὥστε τὸ πεντάγωνον $A B \Gamma \Delta E$ τρέπεται εἰς ἓν τετράπλευρον, τοῦ ὁποίου τὸ ἐμβαδὸν εἶναι σύνθετον ἐκ τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ πενταγώνου $A B \Gamma \Delta E$ καὶ ἐκ τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ τριγώνου $B \Gamma \Gamma$, καὶ καλοῦντες Σ τὸ ἐμβαδὸν πενταγώνου ἔχομεν

$$\Sigma = A T \Delta E - B T \Gamma.$$

Ἀλλὰ, ὡς δίδεται, τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τετραπλεύρου εἶναι ἴσον μὲ τὸ ἡμιάθροισμα τοῦ γινομένου τῶν πλευρῶν τοῦ $a + a, \beta + c, d, e$ ἐκτὸς τῆς e ἀνὰ δύο, ἑκάστου μερικῶν γινομένου πολλαπλασιαζόμενου διὰ τοῦ ἡμιτόνου τῆς γωνίας, τὴν ὁποίαν ἀνὰ δύο αἱ

πλευραὶ σχηματίζουσι, τούτῳ, (α, c)(α, d), (c, d), ὡς

$$A T \Delta E = \frac{1}{2} ((\alpha + a)(\beta + c) \eta\mu(\alpha, c) + (\alpha + a) d \eta\mu(\alpha, d) + c d \eta\mu(c, d))$$

Τὸ δὲ τρίγωνον B Γ T εἶναι ἴσον μὲ $\frac{1}{2} \alpha \beta \eta\mu T$ τούτῳ, $\frac{1}{2} \alpha \beta \eta\mu(\alpha, c)$. λοιπὸν

$$\Sigma = \frac{1}{2} ((\alpha + a)(c + \beta) \eta\mu(\alpha, c) + (\alpha + a) d \eta\mu(\alpha, d) + c d \eta\mu(c, d) - \alpha \beta \eta\mu(\alpha, c))$$
$$\eta \Sigma = \frac{1}{2} ((\alpha c + c a + \alpha \beta) \eta\mu(\alpha, c) + (\alpha d + a d) \eta\mu(\alpha, d) + c d \eta\mu(c, d))$$

Καὶ ἐκ τοῦ τριγώνου B T Γ, ὡς εἰς τὸ ἀνωτέρω Θεώρημα συνάγομεν

$$\alpha : b :: \eta\mu \Gamma : \eta\mu T, \text{ καὶ } \beta : b :: \eta\mu B : \eta\mu T.$$
$$\eta \alpha = \frac{b \eta\mu \Gamma}{\eta\mu T} \quad \text{καὶ} \quad \beta = \frac{b \eta\mu B}{\eta\mu T}$$

Καὶ διὰ τὸν αὐτὸν λόγον $T = \gamma\omega\nu\acute{\iota}\alpha \tau\omega\nu (\alpha, c)$
καὶ $T = \gamma\omega\nu\acute{\iota}\alpha (b, c)$, καὶ $B = \gamma\omega\nu\acute{\iota}\alpha \tau\omega\nu (\alpha, b)$
Λοιπὸν $\Sigma = \frac{1}{2} ((\alpha c \eta\mu(\alpha, c) + b c \eta\mu(b, c) + \alpha b \eta\mu(\alpha, b) + a d \eta\mu(\alpha, d) + b d \eta\mu(\alpha, d)), \dots \eta$
 $\Sigma = \frac{1}{2} ((\alpha b \eta\mu(\alpha, b) + \alpha c \eta\mu(\alpha, c) + a d \eta\mu(\alpha, d) + b c \eta\mu(b, c) + b d \eta\mu(\alpha, d) + c d \eta\mu(c, d))$

Θ Ε Ω Ρ Η Μ Α Ε "

Τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς ἑξάγωνου εἶναι ἴσον μὲ τὸ ἑμικέθροισμα τῶν γινομένων τῶν πλευρῶν τοῦ ἀνὰ δύο ἐκτὸς μιᾶς, ἐκάστου μερικῶς γινόμενου διὰ τοῦ ἡμιτόνου τῆς σχηματιζομένης γωνίας ἐκ τῶν πλευρῶν τούτων πολλαπλασιαζομένου.

στ. Ὡς τὸ ἑξάγωνον A B Γ Δ E Z, καὶ ας ἐκβληθῶσιν ὡς εἰς τὰ ἀνωτέρω Θεωρήματα αἱ δύο πλευραὶ A B, Δ Γ, ἕως οὗ νὰ ἐκμπίδωσιν εἰς τὸ σημεῖον T, οὕτω σχηματίζεται τὸ πεντάπλευρον

$\Delta T \Delta E Z$, τοῦ ὁποῦ αἱ πλευραὶ εἶναι αἱ $a + \alpha, c + \beta, d, c, f$. λοιπὸν κατὰ τὸ προλαβὸν Θεώρημα ἔχομεν

$$\begin{aligned} \Delta T \Delta E Z &= \frac{1}{2}((c\alpha + \alpha)(\beta + c) \eta\mu T + (a + \alpha)d \eta\mu(\alpha d) \\ &+ (a + \alpha)e \eta\mu(\alpha, e) + (c + \beta)d \eta\mu(c, d) + (c + \beta)e \eta\mu(c, e) \\ &+ de \eta\mu(d, e)) = \frac{1}{2}(ac \eta\mu T + (ac + \alpha\beta) \eta\mu T + \alpha\beta \eta\mu T \\ &+ \alpha d \eta\mu(\alpha, d) + \alpha d \eta\mu(\alpha, d) + \alpha e \eta\mu(\alpha, e) + \alpha e \eta\mu(\alpha, e) \\ &+ cd \eta\mu(c, d) + \beta d \eta\mu(c, d) + ec \eta\mu(e, c) + e\beta \eta\mu(e, c) \\ &+ de \eta\mu(d, e)). \end{aligned}$$

Καὶ ἐπειδὴ τὸ σχηματιζόμενον πεντάπλευρον εἶναι ἴσον μὲ τὸ δοθὲν ἐξάπλευρον πλὴν τὸ τρίγωνον $B T \Gamma = \frac{1}{2} \alpha\beta \eta\mu T$, διὰ τοῦτο καλοῦντες Σ τὸ ἔμβαδὸν τοῦ δοθέντος ἐξαγώνου, ἔχομεν $\Delta T \Delta E Z - B T \Gamma = \Sigma = \frac{1}{2}(\alpha c \eta\mu T + \alpha c \eta\mu T + \alpha\beta \eta\mu T + \alpha d \eta\mu(\alpha, d) + \alpha d \eta\mu(\alpha, d) + \alpha e \eta\mu(\alpha, e) + \alpha e \eta\mu(\alpha, e) + cd \eta\mu(c, d) + \beta d \eta\mu(c, d) + ec \eta\mu(e, c) + e\beta \eta\mu(e, c) + de \eta\mu(d, e))$,

Καὶ ἀντιστάγοντες τὰς τιμὰς τῆς α καὶ β αἵτινες πάντοτε προ-
εδιορίζονται ἐκ τοῦ τριγώνου $B T \Gamma$ (τοῦ σχηματιζόμενου πάντοτε
εἰς ὅλα τὰ δεδομένα πολύγωνα) ἐκ τῶν ἐκβεβλημένων μερῶν τῶν
δύο πλευρῶν AB καὶ ΔT , καὶ ἐκ τῆς πλευρᾶς τοῦ δοθέντος πολυ-
γώνου ἣτις εὑρίσκεται μεταξύ τῶν δύο ἐκβεβλημένων πλευρῶν τοῦ
πολύγωνου τούτῳ ἐκ τοῦ τμήματος $B T = \alpha$, $T \Gamma = \beta$, καὶ
ἐκ τῆς πλευρᾶς $B \Gamma = h$, τούτῳ

$$\alpha = \frac{b \eta\mu \Gamma}{\eta\mu T}, \quad \text{καὶ} \quad \beta = \frac{b \eta\mu B}{\eta\mu T}$$

Συνάγομεν

$$\begin{aligned} \Sigma &= \frac{1}{2}(\alpha c \eta\mu T + bc \eta\mu \Gamma + \alpha b \eta\mu B + \alpha d \eta\mu(\alpha, d) \\ &+ \frac{b d \eta\mu \Gamma \eta\mu(\alpha, d)}{\eta\mu T} + \alpha b \eta\mu(\alpha, e) + \frac{b e \eta\mu \Gamma \eta\mu(\alpha, e)}{\eta\mu T} \\ &+ cd \eta\mu(c, d) + \frac{b d \eta\mu B \eta\mu(c, d)}{\eta\mu T} + ec \eta\mu(c, e) \end{aligned}$$

$$\frac{+ b e \eta\mu B \eta\mu (c, e) + e d \eta\mu (d, e)}{\eta\mu \Gamma}$$

Και επειδή

$$\frac{b d (\eta\mu \Gamma \eta\mu (\acute{\alpha}, d) + \eta\mu B \eta\mu (c, d))}{\eta\mu \Gamma}$$

Εξ ατίας της γωνίας $(\acute{\alpha}, d)$ και της γωνίας B λαμβάνει ἄλλην μορφήν, διότι ἡ γωνία τῶν $(\acute{\alpha}, d)$ εἶναι ἡ γωνία τὴν ὁποίαν σχηματίζουν αἱ δύο πλευραὶ $\acute{\alpha}$ καὶ d ὅταν ἐκβληθῶσι, τὴν ὁποίαν καλῶν Γ' , καὶ πάλιν επειδὴ μεταξύ της πλευρᾶς $\acute{\alpha}$ καὶ d εὐρίσκονται περικλεισμέναι δύο πλευραὶ τουτέστιν ἡ b καὶ c , διὰ τοῦτο κατὰ τὸ (1) Θεώρημα

$$\Gamma' = K - 200^\circ \cdot \nu$$

Καὶ τὸ μὲν ν παριστάνει, ὡς εἶρηται, τὸν ἀριθμὸν τῶν περικλεισμένων πλευρῶν, ὅθεν $\nu = 2$, τὸ δὲ K ἐκφράζει τὸ ἄθροισμα τῶν γωνιῶν τοῦ δοθέντος πολυγώνου τῶν εὐρισκομένων μεταξύ τῶν ἐκβληθέντων πλευρῶν, διὰ τοῦτο

$$K = B + \Gamma + \Lambda.$$

Λοιπὸν

$$\Gamma' = B + \Gamma + \Lambda - 200^\circ \cdot 2 = \text{γωνία} (\acute{\alpha}, d)$$

Διὰ τοῦτο

$$\eta\mu (\acute{\alpha}, d) = \eta\mu \cdot (400^\circ \cdot (B + \Gamma + \Lambda - + \eta\mu (B + \Gamma + \Lambda$$

Καὶ γωνία τῶν $(c, d) = \Delta$, λοιπὸν $\eta\mu (c, d) = \eta\mu \Delta$, καὶ ἡ γωνία B ἥτις εἶναι ἡ ἐκτὸς γωνία τοῦ τριγώνου $B T \Gamma$ εἶναι ἴση μὲ τὴν $T + T \Gamma B$ ἢ $T + 200^\circ - \Delta \Gamma B = T + 200^\circ - \Gamma$ λοιπὸν

$$\eta\mu B = \eta\mu (200^\circ - (\Gamma - T)) = \eta\mu (\Gamma - T)$$

Διὰ τοῦτο ἔχομεν

$$\frac{b d (\eta\mu \Gamma \eta\mu (B + \Gamma + \Lambda) + \eta\mu (\Gamma - T) \eta\mu \Delta)}{\eta\mu T}$$

$\eta\mu T$.

Παρατηροῦντες παρομοίως ὅτι $T = K - 200^\circ$, καὶ επειδὴ εἰς

τὰς δύο ἐκβληθείσας πλευρὰς a καὶ c μίᾳ μόνῃ πλευρᾷ περικλείεται τούτιςιν ἢ b , ἔχομεν $v = 1$ καὶ $K = B + \Gamma$ λοιπὸν $T = B + \Gamma - 200^\circ$ καὶ $B + \Gamma = T + 200^\circ$ καὶ

$$B + \Gamma + \Delta = T + 200^\circ + \Delta \text{ καὶ } \eta\mu(B + \Gamma + \Delta) = \eta\mu(200^\circ + \Delta + T) = -\eta\mu(\Delta + T)$$

καὶ διὰ τοῦτο ἔχομεν

$$\begin{aligned} b d (\eta\mu \Delta \eta\mu (\Gamma - T) - \eta\mu \Gamma + \eta\mu (\Delta + T)) &: \eta\mu T \\ = b d (\eta\mu \Delta \eta\mu \Gamma \sigma T - \eta\mu \Delta \sigma \Gamma \eta\mu T - \eta\mu \Gamma \eta\mu \Delta \sigma T \\ - \eta\mu \Gamma \sigma \Delta \eta\mu T) &: \eta\mu T = - b d (\eta\mu \Delta \sigma \Gamma + \eta\mu \Gamma \sigma \Delta) \\ = - b d \eta\mu (\Gamma + \Delta) \end{aligned}$$

καὶ ἐκβάλλοντες τὰς πλευρὰς b καὶ d , σχηματίζομεν τὴν γωνίαν T' ἥτις εἶναι ἴση μὲν $K - 200^\circ$. 1 καὶ $K = \Gamma + \Delta$ διὰ τοῦτο T' ἡ γωνία τῆς $(b, d) = \Gamma + \Delta - 200^\circ = -200^\circ + \Gamma + \Delta$ καὶ $(b, d) + 200^\circ = \Gamma + \Delta$ καὶ $\eta\mu(\Gamma + \Delta) = -\eta\mu(200^\circ - (\Gamma + \Delta))$

$$\begin{aligned} &= -\eta\mu(\Gamma + \Delta) \text{ . λοιπὸν} \\ - b d \eta\mu(\Gamma + \Delta) &= + b d \eta\mu(b, d) : \end{aligned}$$

Παρομοίως οἱ ὄροι

$$\frac{b e (\eta\mu \Gamma \eta\mu (a, c) + \eta\mu B \eta\mu (c, e))}{\eta\mu T}$$

Ἐξ αἰτίας τῆς γωνίας (a, c) ἥτις σχηματίζεται ἂν ἐκβληθῶσιν αἱ δύο πλευραὶ a καὶ c , τὴν ὁποίαν καλῶ T'' εἶναι ἴση μὲν $K - 200^\circ$. 2, καὶ ἐπειδὴ μεταξὺ τῆς a πλευρᾶς καὶ c εἶναι περικλεισμέναι τρεῖς πλευραὶ, διὰ τοῦτο

$$\begin{aligned} T'' \text{ ἡ γωνία τῶν } (a, c) &= B + \Gamma + \Delta + E - 200^\circ \text{ . 3} \\ &= - (600^\circ - (B + \Gamma + \Delta + E)) \text{ καὶ ὡς ἀνωτέρω} \\ B &= 200^\circ - (\Gamma - T) \end{aligned}$$

$$\text{Λοιπὸν γων. } (a, c) = - (600^\circ - (200^\circ - \Gamma + T + \Gamma + T))$$

$$\Delta + E = - (400^\circ - (T + \Delta + E))$$

και

$$\eta\mu(\alpha, e) = + \eta\mu(T + \Delta + E).$$

και γωνία των (c, e) είναι η γωνία την οποίαν σχηματίζουν αι δύο πλευραι c και e, εάν εκβληθώσιν, αιτινες περιλείουσι μίαν πλευράν την d, δια τουτο

$$\gamma\omega\nu\acute{\iota}\alpha(c, e) = K - 200^\circ \cdot 1 = \Delta + E - 200^\circ$$

και $\eta\mu(c, e) = - \eta\mu(\Delta + E)$. λοιπόν έχομεν

$$\begin{aligned} b e &= (\eta\mu \Gamma \eta\mu (T + \Delta + E) - \eta\mu (\Gamma - T) \eta\mu (\Delta + E)); \eta\mu \Gamma \\ &= b e (\eta\mu \Gamma \eta\mu T \sigma (\Delta + E) + \eta\mu \Gamma \sigma \Gamma \eta\mu (\Delta + E) - \\ &\eta\mu \Gamma \eta\mu (\Delta + E) \sigma \Gamma + \eta\mu T \sigma \Gamma \eta\mu (\Delta + E) : \eta\mu T \\ &= - b e \eta\mu (\Gamma + \Delta + E). \end{aligned}$$

Και επειδη αι γωνιαί $\Gamma + \Delta + E$ είναι αι γωνιαί του δοθέντος πολυγώνου μεταξύ των δύο εκβληθεισών πλευρών b, και e, έχομεν λοιπόν

$$\gamma\omega\nu\acute{\iota}\alpha \tau\omega\nu(b, e) = K - 3 \cdot 200^\circ = \Gamma + \Delta + E - 600^\circ \text{ και}$$

$$\eta\mu(b, e) = \eta\mu - (600^\circ - (\Gamma + \Delta + E)) = - \eta\mu(\Gamma + \Delta + E) \text{ τώρα αντιστρέφοντες εύρισκομεν}$$

$$\begin{aligned} \Sigma &= \frac{1}{2} (\alpha b \eta\mu(\alpha, b) + \alpha c \eta\mu(\alpha, c) + \alpha d \eta\mu(\alpha, d) \\ &+ \alpha e \eta\mu(\alpha, e) + b c \eta\mu(b, c) + b d \eta\mu(b, d) \\ &+ b e \eta\mu(b, e) + c d \eta\mu(c, d) + c e \eta\mu(c, e) + d e \eta\mu(d, e)) \end{aligned}$$

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Παρατηρούντες το (β'), (γ') Θεώρημα, βλέπομεν ότι το έμβασθόν του τριγώνου εκφράσθη εις το (β) ως έπροβάλλομεν, εις δε (γ). (δ') και (ε') εκβάλαμεν τας δύο πλευρας Α Β και Α Γ, τουτέστιν α και c, η έν γίνει δύο πλευρας αιτινες ένόνουν τα δύο άκρα μιας και της αυτης πλευρας του πολυγώνου, και ούτως με αυτην τα δύο εκβεβλημένα μέρη έσχημάτισαν έντρίγωνον το οπού

ἐν ἰνωμένον μὲ το δοθέν πολυγώνον ἐσχημάτισεν εὐθύγραμμον σχῆμα
 μιᾶς πλευρᾶς ὀλιγώτερον τοῦ δοθέντος σχήματος, καὶ ἀφαιρούμενον
 τὸ ἴδιον τρίγωνον ἐκ τοῦ σχηματιζομένου εὐθύγραμμου ἔδωκε πάν-
 τοτε τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ δοθέντος πολυγώνου, προσέτι αἱ δύο κατ'
 ἐξακολουθήσειν πλευραὶ τοῦ σχηματιζομένου εὐθύγραμμου εἶναι σύν-
 θετοι πάντοτε ἐκ τῶν δύο πλευρῶν τοῦ δοθέντος πολυγώνου, καὶ
 ἐκ τῶν δύο ἐκβεβλημένων τμημάτων των, καὶ ἡ περιχομένη ἐξ
 αὐτῶν γωνία εἰς τὸ σχηματιζόμενον σχῆμα εἶναι ἡ αὐτὴ μὲ τὴν τοῦ
 σχηματιζομένου τριγώνου ἐκ τῶν ἐκβεβλημένων τμημάτων καὶ ἐκ
 τῆς περικλεισμένης πλευρᾶς εἰς τὰς δύο ἐκβεβλημένας. λοιπὸν ὅταν
 ἡ πρώτη πλευρὰ τοῦ σχηματιζομένου πολυγώνου ἢ σύνθετος ἐκ τῆς
 πρώτης πλευρᾶς τοῦ δοθέντος πολυγώνου, καὶ τῆς προεκβολῆς τῆς,
 πολλαπλασιάζει τὴν δευτέραν σύνθετον ἐξ αὐτοῦ καὶ τοῦ ἡμιτόνου
 τῆς ὑπ' αὐτῶν περιχομένης γωνίας, ἔχομεν διὰ μερικὰ γινού-
 μενα, παραδειγματὸς χάριν, τὸ γινόμενον τῶν δύο ἐκβεβλημένων με-
 ρῶν διὰ τοῦ ἡμιτόνου τῆς σχηματιζομένης γωνίας σὺν τῷ γινομένῳ
 τῆς πρώτης πλευρᾶς τοῦ δοθέντος πολυγώνου, καὶ διὰ τῆς προεκ-
 βολῆς τῆς τρίτης πλευρᾶς τοῦ δοθέντος πολυγώνου καὶ διὰ τοῦ ἡ-
 μιτόνου τῆς ἰσᾶς γωνίας σὺν τῷ γινομένῳ τῆς τρίτης πλευρᾶς
 τοῦ δοθέντος πολυγώνου, καὶ διὰ τοῦ ἡμιτόνου τῆς αὐτῆς γωνίας,
 καὶ τέλος πάντων τὸ γινόμενον τῆς πρώτης πλευρᾶς τοῦ δοθέντος
 πολυγώνου διὰ τῆς τρίτης, καὶ διὰ τοῦ ἡμιτόνου τῆς σχηματιζομέ-
 νης γωνίας ἐκ τῆς πρώτης καὶ τρίτης πλευρᾶς τοῦ δοθέντος πολυ-
 γώνου. εἰς δὲ τὸ γινόμενον τῆς πρώτης συνθέτου πλευρᾶς τοῦ σχη-
 ματιζομένου πολυγώνου μὲ τὴν τρίτην τετάρτην, καὶ ἐφεξῆς πλευρᾶν τοῦ
 αὐτοῦ πολυγώνου, ἐκτὸς ὅτι εὐρίσκεται τὸ γινόμενον τῆς πρώτης πλευ-
 ρᾶς τοῦ δοθέντος πολυγώνου, διὰ τὰς τετάρτης, πέμπτης, καὶ ἐφε-
 ξῆς πλευρᾶς τοῦ δοθέντος πολυγώνου, ὑπάρχει καὶ τὸ γινόμενον τῆς
 τετάρτης, πέμπτης καὶ ἐφεξῆς πλευρᾶς τοῦ δοθέντος πολυγώνου διὰ
 τῆς προεκβολῆς τῆς πρώτης. παρομοίως εἰς τὸ γινόμενον τῆς συν-
 θέτου δευτέρας πλευρᾶς τοῦ σχηματιζομένου πολυγώνου διὰ τῆς τρί-
 τῆς, τετάρτης καὶ ἐφεξῆς πλευρᾶς τοῦ δοθέντος πολυγώνου εὐρίσκον-
 ται καὶ τὰ γινόμενα τῶν ἰδίων πλευρῶν τοῦ δοθέντος πολυγώνου
 διὰ τῆς προεκβολῆς τῆς τρίτης αὐτοῦ πλευρᾶς,

Όλα δὲ τ' ἄλλα γινόμενα εἶναι καθ' ὅλας τὰς περιπτώσεις τὰ γινόμενα τῶν ἄλλων πλευρῶν τοῦ δοθέντος πολυγώνου ἀνὰ δύο. καὶ ἐπειδὴ ἐκ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σχηματιζομένου πολυγώνου πρέπει ν' ἀφαιρέσωμεν τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σχηματιζομένου τριγώνου διὰ νὰ εὐρωμεν ἐκείνην τοῦ δοθέντος πολυγώνου, διὰ τοῦτο, τὸ ἔμβαδον τοῦ δοθέντος πολυγώνου ἐκφράζεται δι' ὅλων τῶν ἀνω εἰρημένων γινόμενων ἐκτὸς τοῦ γινομένου τῶν δύο ἐκβεβλημένων τμημάτων διὰ τοῦ ἡμιστόνου τῆς σχηματιζομένης ἐξ αὐτῶν γωνίας, δηλαδὴ ἐκφράζεται διὰ τοῦ γινομένου τῶν πλευρῶν του ἀνὰ δύο καὶ διὰ τῶν μερικῶν γινομένων τῶν πλευρῶν του ἐκτὸς πάντοτε μιᾶς διὰ τῶν προειρηθῶν. καὶ ἐπειδὴ ἔχομεν πάντοτε

$$\alpha = \frac{b \eta \mu \Gamma}{\tau \mu \Gamma} \quad \text{καὶ} \quad \beta = \frac{b \eta \mu B}{\eta \mu \Gamma}$$

Ἀντιεσάγοντες τάς τας ποσότητας, καὶ ἄγοντες τὸν γενικὸν τύπον εἰς τὸ ἀπλούστερον, ἔχομεν πάντοτε τὸ ἔμβαδον ἐκάστου πολυγώνου, καὶ ἐπειδὴ ὁ σχηματισμὸς τοῦ τύπου εἶναι ἀποδαδειγμένος εἰς τὸ ἑξάπλευρον, διὰ τοῦτο ὑπάρχει καὶ διὰ τὸ ἑπτάπλευρον, καὶ οὕτως ἐφεξῆς. ὅθεν καλοῦντες $\alpha, b, c, d, e, f, g, h, i, l$ ἔχομεν ὄντως Σ τοῦ ἔμβαδοῦ,

$$\begin{aligned} \Sigma = & \frac{1}{2} ((\alpha b \eta \mu (\alpha, b) + \alpha c \eta \mu (\alpha, c) + \alpha d \eta \mu (\alpha, d) \\ & + \alpha e \eta \mu (\alpha, e) + \alpha h \eta \mu (\alpha, h) + \alpha b \eta \mu (\alpha, i) + \\ & b c \eta \mu (b, c) + b d \eta \mu (b, d) + b e \eta \mu (b, e) + b f \eta \mu (b, f) \\ & + b g \eta \mu (b, g) + b h \eta \mu (b, h) + b i \eta \mu (b, i) + c d \eta \mu (c, d) \\ & + c e \eta \mu (c, e) + c f \eta \mu (c, f) + c g \eta \mu (c, g) + c h \eta \mu (c, h) \\ & + c i \eta \mu (c, i) + d e \eta \mu (d, e) + d f \eta \mu (d, f) + \\ & d g \eta \mu (d, g) + d h \eta \mu (d, h) + d i \eta \mu (d, i) + e f \eta \mu (e, f) \\ & + e g \eta \mu (e, g) + e h \eta \mu (e, h) + e i \eta \mu (e, i) + f g \eta \mu (f, g) \\ & + f h \eta \mu (f, h) + f i \eta \mu (f, i) + g h \eta \mu (g, h) + g i \eta \mu (g, i) \\ & + h i \eta \mu (h, i)) \end{aligned}$$

ΣΧΟΛΙΟΝ.

Δυνάμεθα ἀντὶ τῶν γωνιῶν (α, β) , (α, ϵ) καὶ ἐφεξῆς νὰ ἀν-
 τιστοιῶμεν τὰς γωνίας τοῦ δοθέντος πολυγώνου, καὶ τοῦτο ἐκτε-
 λοῦμεν ἐκ τοῦ τύπου $T = K \cdot 200^\circ \cdot \nu$, ὅστις κατὰ τὸ πρῶτον Θε-
 ῶρημα ἐκφράζει τὴν σχέσιν μεταξὺ τῆς σχηματιζομένης γωνίας ἐκ
 δύο ἐκβεβλημένων πλευρῶν μὲ τὰς γωνίας τοῦ πολυγώνου τὰς σχη-
 ματιζομένας ἐκ τῶν πλευρῶν τοῦ πολυγώνου, ταυτέσι τὰς δύο ἐκβε-
 βλημένας, καὶ ἐκ τῶν εἰς αὐτὰς περικλεισμένων, καὶ τὸ μὲν T πα-
 ρεῖται τὴν σχηματιζομένην γωνίαν ἐκ τῶν δύο πλευρῶν, τὸ δὲ K
 τὸ ἄθροισμα τῶν ἄνω εἰρημένων γωνιῶν, καὶ τὸ ν τὸν ἀριθμὸν τῶν
 περικλεισμένων πλευρῶν μεταξὺ τῶν δύο ἐκβεβλημένων πλευρῶν τοῦ
 δοθέντος πολυγώνου. λοιπὸν

$$(\alpha, \beta) = B, \text{ διότι } \nu = 0. \text{ τῆς δὲ } (\alpha, \epsilon) = B + \Gamma - 200^\circ. 1$$

$$\text{καὶ ἡμ } (\alpha, \epsilon) = -\text{ἡμ } (B + \Gamma), \text{ καὶ τῆς}$$

$$(\alpha, \delta) = B + \Gamma + \Delta - 200^\circ. 2 \text{ ἢ } \text{ἡμ } (\alpha, \epsilon) = \text{ἡμ } (B + \Gamma + \Delta) \text{ καὶ } (\alpha, \epsilon) = B + \Gamma + \Delta + E - 200^\circ. 3 \text{ καὶ}$$

$$\text{ἡμ } (\alpha, \epsilon) = -\text{ἡμ } (B + \Gamma + \Delta + E) \text{ καὶ τῆς } (\alpha, \zeta)$$

$$= B + \Gamma + \Delta + \dots + Z - 200^\circ. 4 \text{ καὶ ἡμ } (\alpha, \zeta)$$

$$= \text{ἡμ } (B + \Gamma + \Delta + E + Z), \text{ καὶ τῆς}$$

$$(\alpha, \eta) = B + \Gamma + \Delta + E + Z + H - 200^\circ. 5, \text{ καὶ}$$

$$\text{ἡμ } (\alpha, \eta) = -\text{ἡμ } (B + \Gamma + \Delta + E + Z + H) \text{ καὶ τῆς}$$

$$(\alpha, \theta) = (B + \Gamma + \Delta + E + Z + H + \Theta - 200^\circ. 6)$$

$$= \text{ἡμ } (B + \Gamma + \Delta + E + Z + H + \Theta) \text{ καὶ τῆς } (\alpha, \iota)$$

$$= (B + \Gamma + \Delta + E + Z + H + \Theta + I - 200^\circ. 7$$

$$\text{καὶ ἡμ } (\alpha, \iota) = -\text{ἡμ } (B + \Gamma + \Delta + E + Z + H + \Theta + I)$$

$$\text{καὶ τῆς } (\beta, \epsilon) = \Gamma \text{ καὶ ἡμ } (\beta, \epsilon) = \text{ἡμ } \Gamma. \text{ ἐπειδὴ } \nu = 0$$

$$\text{εἰς ταύτην τὴν περίστασιν, καὶ τῆς } (\beta, \delta) = \Gamma + \Delta - 200^\circ. 1$$

$$\text{καὶ ἡμ } (\beta, \delta) = -\text{ἡμ } (\Gamma + \Delta) \text{ καὶ τῆς}$$

$$(\beta, \epsilon) = \Gamma + \Delta + E - 200^\circ. 2 \text{ καὶ}$$






$\eta\mu (b, e) = \eta\mu (\Gamma + \Delta + E)$, και $\tau\tilde{\eta}\zeta (b, f) = \Gamma + \Delta + E + Z - 200^\circ$. 3 και $\eta\mu (b, f) = -\eta\mu (\Gamma + \Delta + E + Z)$ και $\tau\tilde{\eta}\zeta (b, g) = \Gamma + \Delta + E + Z + H - 200^\circ$. 4. και $\eta\mu (b, g) = \eta\mu (\Gamma + \Delta + E + Z + H)$, και $\tau\tilde{\eta}\zeta (b, h) = \Gamma + \Delta + E + Z + H + \Theta - 200^\circ$. 5, και $\eta\mu (b, h) = -\eta\mu (\Gamma + \Delta + E + Z + H + \Theta)$ και $\tau\tilde{\eta}\zeta (b, i) = \Gamma + \Delta + E + Z + H + \Theta + I - 200^\circ$ 6. και

$\eta\mu (b, i) = \eta\mu (\Gamma + \Delta + E + Z + H + \Theta + I)$

και $\tau\tilde{\eta}\zeta (c, d) = \Delta$, και $\eta\mu (c, d) = \eta\mu \Delta$, και $\tau\tilde{\eta}\zeta (c, e) = \Delta + E - 200^\circ$. 1 $\eta\mu (c, e) = -\eta\mu (\Delta + E)$ και $\tau\tilde{\eta}\zeta (c, f) = \Delta + E + Z - 200^\circ$. 2 και $\eta\mu (c, f) = \eta\mu (\Delta + E + Z)$ και $\tau\tilde{\eta}\zeta (c, g) = \Delta + E + Z + H - 200^\circ$. 3 και $\eta\mu (c, g) = -\eta\mu (\Delta + E + Z + H)$, και $\tau\tilde{\eta}\zeta (c, h) = (\Delta + E + Z + H + \Theta - 200^\circ)$. 4) και $\eta\mu (c, h) = \eta\mu (\Delta + E + Z + H + \Theta)$ και $\tau\tilde{\eta}\zeta (c, i) = \Delta + E + Z + H + \Theta + I - 200^\circ$. 5 και $\eta\mu (c, i) = -\eta\mu (\Delta + E + Z + H + \Theta + I)$, και $\tau\tilde{\eta}\zeta (d, e) = E$ και $\eta\mu (d, e) = \eta\mu E$. και $\tau\tilde{\eta}\zeta (d, f) = E + Z - 200^\circ$. 1 και $\eta\mu (d, e) = \eta\mu E$. και $\tau\tilde{\eta}\zeta (d, f) = E + Z - 200^\circ$. 1 και $\eta\mu (d, f) = -\eta\mu (E + Z)$ και $\tau\tilde{\eta}\zeta (d, g) = E + Z + H - 200^\circ$. 2 και $\eta\mu (d, g) = \eta\mu (E + Z + H)$, και $\tau\tilde{\eta}\zeta (d, h) = E + Z + H + \Theta - 200^\circ$. 3. και $\eta\mu (d, h) = -\eta\mu (E + Z + H + \Theta)$ και $\tau\tilde{\eta}\zeta (d, i) = (E + Z + H + \Theta + I - 200^\circ)$. 4) και $\eta\mu (d, i) = \eta\mu (E + Z + H + \Theta + I)$ και $\tau\tilde{\eta}\zeta (e, f) = Z$ και $\eta\mu (e, f) = \eta\mu Z$. και $\tau\tilde{\eta}\zeta (e, g) = Z + H - 200^\circ$ και $\eta\mu (e, g) = -\eta\mu (Z + H)$ και $\tau\tilde{\eta}\zeta (e, h) = Z + H + \Theta - 200^\circ$. 2 και $\eta\mu (e, h) = \eta\mu (Z$

$+ H + \Theta)$ και $\tau\eta\varsigma (e, i) = Z + H + \Theta + I - 200^\circ . 3)$
 και $\eta\mu (e, i) = \eta\mu (Z + H + \Theta + I)$ και $\tau\eta\varsigma (f, g) =$
 H και $\eta\mu (f, g) = \eta\mu H$, και $\tau\eta\varsigma (f, h) = H + \Theta - 200^\circ . 1$
 και $\eta\mu (f, h) = \eta\mu (H + \Theta)$, και $\tau\eta\varsigma (f, i) =$
 $(H + \Theta + I - 200^\circ . 2)$, και $\eta\mu (f, i) = \eta\mu (H + \Theta + I)$
 και $\tau\eta\varsigma (g, h) = \Theta$, και $\eta\mu (g, h) = \eta\mu \Theta$, και $\tau\eta\varsigma (g, i) =$
 $(\Theta + I - 200^\circ . 1)$. και $\eta\mu (g, i) = \eta\mu (\Theta + I)$ και
 $\tau\eta\varsigma (h, i) = I$ και $\eta\mu (h, i) = \eta\mu I$, και αντίστοιχως έχομεν
 τὴν τιμὴν τοῦ ἔμβυδου τοῦ δοθέντος εὐθυγράμμου σχήματος διὰ
 μέσου τῶν πλευρῶν τοῦ μείον μιᾶς καὶ τῶν γωνιῶν τοῦ μείον δύο.

Τ Ε Λ Ο Σ



95' έν' δυνάσαν λάβον.

96: 96α παρίματα καδ' εδογράδα

testo
Lacros L έν' ομοχίρμα έν' ομοχίρμα

95' έν' μογοέρα λάβον.
έβηρα

testo
Lacros L έν' ομοχίρμα

97α έν' ανάρμα έμοσία λάβον να έλασκαρδίσον
αδ' ομοχίρμα έν' λαυρα.

αδ' ε λευλαία έν' τεωρεσίαν έν' γεβνόνον

από ην' ορμήν νοεμβρί. 1825.

95' ην' ορμήν λάβην αυδαρμένην

από αυδαρμένην

έδοσα καθ' εμάτην έβδωδα 95' αὐτῆ' 10. ραδίμετα.

αὐτῆ' εἰς εἴρησιν εἰς αὐτοῦ δὲ πύργου 95'.

testo
Legendre { Στερομελοία
Σερρομελοία
αὐδύραρον Σιγνομελοία
Σερρικὴ Σιγνομελοία

testo
Lacour { εὐραγονί' εἰς ἀγέρας 95' ην' Κορμελοία
Καυμαί' Κορμαί.

testo
Monge { Σερρομελοία Στερομελοία εὐραγονί' 95' εἰς
υἱολογιστό.

testo
Poisant { Στερομελοία εὐραγονί' 95' ην' Κορμελοία